

## Lijst invasieve procedure per bloedingsrisico

### LAAG bloedingsrisico

- Mineure tandheelkundige en dermatologische ingrepen
- Cataractheelkunde
- Diagnostische gastroscopie/bronchoscopie zonder biopsie of punctie
- Polspinning
- Coronarografie via radiale weg
- EN geen gekende bloedingsneigingen

### MATIG bloedingsrisico

- Biopsie/punctie bij endoscopie, prostaat, blaas, borst, schildklier, okselklier
- Ascitespuncties, pleurapunctie en plaatsing thoraxdrain
- PTA, angiografie, DVC en flebologische procedures
- Implantatie van pacemakers of ICD's
- Coronarografie en EFO via femorale weg
- Arthroscopie

### HOOG bloedingsrisico

- Cardio-thoracale heelkunde
- Neuraxiale anesthesie en lumbaalpunctie/catheter
- Vaatheelkunde
- Heup- en kniearthroplastie, kruisbandherstel
- Reconstructieve plastische heelkunde en borstchirurgie
- Alle abdominale en vaginale chirurgie
- Blaaschirurgie
- Resectie colonpoliepen en endoscopische sfincterotomie
- Long-, nier- en leverbiopsie


### ZEER HOOG bloedingsrisico

- Neurochirurgie
- Prostaatchirurgie
- Amygdalectomie
- Posterieure oogkamer heelkunde

### TROMBO-EMBOLISCH RISICO BIJ VOORKAMERFIBRILLATIE

- CHA2DS2-VASc- score bepaalt het risico op trombo-embolische complicaties van chronische voorkamerfibrillatie:

- C : congestive heart failure	1 punt
- H : hypertension	1 punt
- A2 : age ≥ 75	2 punten
- D : diabetes	1 punt
- S2 : stroke/TIA/thromboembolism	2 punten
- V : Vascular disease	1 punt
- Age 65-74	1 punt
- Female	1 punt



\* Overleg met behandelende cardioloog.

Het routinegebruik van LMWH voor peri-op bridging van plaatjesremmers is niet aanbevolen.

ASA= Acetylsalicylzuur; MI= Myocardinfarct; PCI= Percutane Coronaire Interventie; BMS= Bare Metal Stent; DES= Drug Eluting Stent.

Na de ingreep of invasieve procedure: herstart plaatjesremmers zodra de haemostase bereikt is, meestal minder of gelijk aan 24 uur na de ingreep.

## Peri-operatieve overbruggingstherapie bij

### 1. Vitamine K Antagonisten (VKA)

of

### 2. Nieuwe Orale Anticoagulantia (NOACs) 2016

of

### 3. Antiaggregantia

INTERNATIONALE EENHEDEN (I.E.) ANTI-Xa ACTIVITEIT VAN CLEXANE®



CLEXANE® (20 mg)/0,2 ml oplossing voor injectie	= 2.000 IE
CLEXANE® (40 mg)/0,4 ml oplossing voor injectie	= 4.000 IE
CLEXANE® (60 mg)/0,6 ml oplossing voor injectie	= 6.000 IE
CLEXANE® (80 mg)/0,8 ml oplossing voor injectie	= 8.000 IE
CLEXANE® (100 mg)/1 ml oplossing voor injectie	= 10.000 IE
CLEXANE® (120 mg)/0,8 ml oplossing voor injectie	= 12.000 IE
CLEXANE® (150 mg)/1 ml oplossing voor injectie	= 15.000 IE
CLEXANE® (300 mg)/3 ml oplossing voor injectie	= 30.000 IE



Sint-Maria Halle  
ALGEMEEN ZIEKENHUIS



Thrombosis Care | www.thromboscare.be



- Pas op bij nierinsufficiëntie. Halveer dosis als Cr Kl < 30ml/min
- VKA niet onderbreken bij laag bloedingsrisico (ken recente INR)
- Postop Clexane® uitstellen bij hemostaseproblemen
- Bij overbruggingsschema geen extra Clexane® als profylaxie

\* Bij levensbedreigende bloedingen onder Pradaxa®: Praxbind (aanwezig op spoed). 2 flacons (2,5 g opgelost in 50 ml) in 1 keer toedienen. Bijsluiter te vinden op [www.farmacotherapeutischkompas.nl](http://www.farmacotherapeutischkompas.nl)  
 - Bij complicaties (vb. Bloeding, allergie...): zie procedure «Peri-operatieve overbruggingstherapie bij antiaggregantia of (nieuwe) anticoagulantia.  
 - Bij overbruggingsschema geen extra Clexane® als profylaxie